

ASL VCO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 20 POSTI DI
C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) CON GESTIONE CONDIVISA DELLA
PROCEDURA TRA LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA TERRITORIALE
NORD PIEMONTE (ASL VCO, ASL NO, ASL VC, AOU NOVARA)

QUESTIONARIO**5****VERSIONE****A****ISTRUZIONE IMPORTANTE**

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **A**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** VERSIONE **C**

VERSIONE **B** VERSIONE **D**

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

1. La definizione di processo è:

- A. la sequenza di attività interconnesse finalizzate alla realizzazione di un obiettivo definito
- B. l'utilizzo razionale delle risorse umane e strumentali finalizzato al raggiungimento di un determinato obiettivo
- C. la capacità di raggiungere risultati professionali con il minore dispendio di energie
- D. un insieme di raccomandazioni correlate alla pratica clinica

2. Devo somministrare 380 mg di Ciprofloxacina sciroppo a un bambino che pesa 25 kg. Il flacone fornito dalla farmacia ha una concentrazione di 250 mg ogni 5 ml. Quanti ml. devo somministrare:

- A. 9 ml
- B. 7,6 ml
- C. 3 ml
- D. 5,7 ml

3. La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico:

- A. dell'apparato osteoarticolare
- B. dell'apparato respiratorio
- C. della cute
- D. tutte le risposte sono corrette

4. Chi individua i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza):

- A. le ASL
- B. le ASO/AOU/ASL/AST
- C. lo Stato
- D. le Regioni nell'ambito della loro autonomia amministrativa e normativa

5. Il D.A.E. (defibrillatore automatico esterno):

- A. è un presidio di esclusivo utilizzo medico
- B. è un presidio salvavita utilizzabile da chiunque sia abilitato e certificato
- C. è un presidio esclusivamente di uso ospedaliero
- D. è un presidio esclusivamente utilizzabile nell'ambito delle emergenza territoriale

6. Quale tra le seguenti raccomandazioni inerenti la prevenzione delle lesioni da pressione è corretta:

- A. assicurare l'idratazione attraverso un'adeguata assunzioni di liquidi
- B. nell'igiene quotidiana, effettuata almeno due volte al giorno, utilizzare acqua calda e detergenti disinfettanti con PH acido
- C. frizionare e massaggiare ogni 3/4 ore con crema idratante le prominenze ossee
- D. cambiare la biancheria del letto a orari prestabiliti

7. Per la misurazione della PVC è utilizzato il catetere di Swan-Ganz questo viene posizionato:

- A. nell'atrio destro, per valutare la funzionalità del ventricolo destro
- B. nella vena cava inferiore
- C. nel ventricolo sinistro
- D. nel ventricolo destro, per valutare il ritorno venoso al cuore

8. Nella gestione di un catetere venoso centrale è importante:

- A. rimuovere prontamente qualsiasi catetere vascolare non più necessario (sospensione della terapia o possibile somministrazione per via periferica)
- B. usare una medicazione semipermeabile e la garza sterile per coprire il sito d'inserzione
- C. utilizzare per la medicazione clorexidina al 2%
- D. tutte le risposte sono corrette

9. La legge attuale che tutela i lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è:

- A. D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
- B. D. Lgs 230/1995 e s.m.i.
- C. D. Lgs 187/2000 e s.m.i.
- D. D. Lgs 178/2000 e s.m.i.

10. Il rischio clinico è inteso come:

- A. probabilità
- B. eventualità
- C. evento avverso
- D. intenzionalità del fatto

11. Un evento sentinella è:

- A. un evento inatteso
- B. un evento prevedibile
- C. un evento pericoloso
- D. un errore solo imprevedibile

12. La pianificazione assistenziale infermieristica:

- A. si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi
- B. si applica solo quando è necessario
- C. si basa sul processo di assistenza
- D. non si applica alle persone con alta complessità assistenziale

13. Per isolamento protettivo si intende:

- A. l'isolamento di un paziente che è fonte di infezione grave al fine di evitare la diffusione della malattia
- B. il posizionamento di superfici barriera dopo accurata disinfezione di un campo chirurgico
- C. l'isolamento di un paziente altamente sensibile alle infezioni
- D. nessuna delle risposte è corretta

14. Quali tipo di monitoraggio sulla persona assistita sono previsti durante la contenzione fisica:

- A. pressione arteriosa, frequenza cardiaca e temperatura
- B. frequenza cardiaca, temperatura corporea e frequenza respiratoria
- C. frequenza cardiaca, temperatura corporea e monitoraggio dell'alvo
- D. frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea, monitoraggio dell'alvo e minzione

15. Per linea guida in ambito sanitario si intende:

- A. un insieme di tecniche operative ritenute sicure
- B. un insieme di procedure operative elaborate da esperti aziendali
- C. un insieme di raccomandazioni
- D. un insieme di outcome

16. La contenzione secondo il Codice Deontologico degli Infermieri:

- A. è possibile, come rimedio eccezionale, con motivazione e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale
- B. è sempre possibile quella farmacologica
- C. non è mai possibile
- D. è possibile solo nei reparti di psichiatria

17. Quale tra le seguenti raccomandazioni è indicata per ridurre il rischio di infezioni legate al catetere vescicale:

- A. utilizzare il catetere per un breve periodo
- B. inserire il catetere con tecnica asettica e presidi sterili
- C. limitare l'uso nei soggetti a rischio di sviluppare infezioni delle vie urinarie in particolare donne, anziani e soggetti immunodepressi
- D. tutte le risposte sono corrette

18. Quali sono le modalità di identificazione della persona assistita nella presa in carico del paziente:

- A. attraverso la lettura della cartella clinica-assistenziale
- B. attraverso l'identificazione attiva chiedendo alla persona assistita se collaborante oppure ai familiari e verificando il riscontro dei dati anagrafici nella documentazione clinica
- C. attraverso un controllo di corrispondenza tra planning posti letto e camera del paziente
- D. tutte le risposte sono corrette

19. La manovra di aspirazione endotracheale nel paziente intubato:

- A. deve essere prolungata per almeno 30 secondi per essere certi di avere rimosso tutte le secrezioni
- B. non deve durare più di 10-15 secondi per non provocare effetti collaterali
- C. non deve avere durata inferiore a 40 secondi per garantire la massima efficacia
- D. nessuna delle risposte è corretta

20. Rispetto al dolore delle persona assistita, il professionista infermiere, secondo il codice deontologico, ha il compito di:

- A. prevenire il dolore, senza documentarlo, al fine di rispettare la sua riservatezza
- B. prevenire, rilevare e documentare il dolore dell'assistito durante tutto il percorso di cura
- C. prevenire e gestire il dolore
- D. rilevare e gestire il dolore solo nella fase acuta della malattia

21. La manovra di Lesser viene utilizzata:

- A. in caso di ostruzione delle vie aeree da caduta della lingua
- B. per la riduzione ematica della CO₂ attraverso la respirazione a labbra serrate
- C. per controllare il corretto posizionamento del sondino naso gastrico
- D. durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico

22. Quale tra questi non è un effetto correlato alla somministrazione della morfina:

- A. miosi
- B. diarrea
- C. nausea
- D. depressione respiratoria

23. E' possibile in corso di somministrazione di sacca di sangue o di plasma, in caso di necessità aggiungere uno o più farmaci nella sacca:

- A. no
- B. si, in caso di reazione anafilattica il cortisone
- C. si
- D. si, in alcuni casi

24. Un paziente adulto si definisce oligurico se la quantità di urine escrete nelle 24 ore è inferiore a:

- A. 100 ml
- B. 300 ml
- C. 500 ml
- D. 400 ml

25. L'insieme delle diagnosi infermieristiche e dei problemi collaborativi viene definito:

- A. modello bifocale
- B. primary nursing
- C. complicità potenziale
- D. piano di assistenza

26. Nella Raccomandazioni Ministeriali in tema di prevenzione del rischio correlato all'uso dei farmaci viene raccomandato di:

- A. utilizzare tecnologie informatiche per la prescrizione e somministrazione
- B. attivare la preparazione centralizzata dei farmaci chemioterapici
- C. attivare procedure specifiche per la segnalazione degli eventi sentinella
- D. tutte le risposte sono corrette

27. Che cosa si intende per ferita:

- A. perdita di uno strato epiteliale solo in seguito a un trauma lacerato contusivo
- B. perdita della soluzione di continuo della cute o della mucosa
- C. perdita della soluzione di continuo della cute o della mucosa conseguente a una incisione chirurgica
- D. perdita della soluzione di continuo della sola cute

28. Una reazione anafilattica grave si può manifestare:

- A. solo nei soggetti con allergia già nota
- B. in qualunque soggetto in opportune condizioni
- C. nei soggetti atopici
- D. nei soggetti con immunodepressione

29. Per "effetti collaterali" di un farmaco s'intendono:

- A. gli effetti farmacologici non desiderati, ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
- B. gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
- C. gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
- D. gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche

30. In caso di stravasamento di una sostanza o farmaco da un catetere venoso periferico, quale tra questi interventi infermieristici è da ritenersi errato:

- A. rimuovere immediatamente l'ago e applicare un impacco con acqua calda
- B. interrompere la somministrazione, informare il medico, non rimuovere l'accesso venoso prima di avere aspirato la maggiore quantità possibile di sostanza o di farmaco poi riutilizzare l'ago senza problemi
- C. rimuovere l'ago senza altre precauzioni
- D. tutte le risposte sono errate

