


ASL VCO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 20 POSTI DI
C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) CON GESTIONE CONDIVISA DELLA
PROCEDURA TRA LE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA TERRITORIALE
NORD PIEMONTE (ASL VCO, ASL NO, ASL VC, AOU NOVARA)

QUESTIONARIO

8



VERSIONE

A

ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **A**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** VERSIONE **C**

VERSIONE **B** VERSIONE **D**

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

- 1. L'Infermiere nel compilare la documentazione clinico-assistenziale, risponde di falso ideologico quando:**
 - A. esegue una contraffazione del documento , cancellando, sostituendo o aggiungendo dati
 - B. attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o avvenuto in sua presenza oppure omette o altera dichiarazioni da lui ricevute
 - C. si rifiuta di compilare la cartella clinico-assistenziale per motivi ideologici
 - D. fa compilare la documentazione di propria competenza da altro operatore

- 2. La " compromissione della mobilità " è:**
 - A. una complicanza clinica che si riscontra nei pazienti anziani
 - B. un problema collaborativo
 - C. una diagnosi infermieristica
 - D. una diagnosi riabilitativa

- 3. La prescrizione farmacologica prevede la somministrazione di 0,125 mg del farmaco "xvxxv", in reparto è disponibile il farmaco nel dosaggio da 0,25 mg, quante compresse devi somministrare:**
 - A. due compresse
 - B. mezza compressa
 - C. una compressa + mezza
 - D. devo attenermi scrupolosamente alla prescrizione reperendo il farmaco nel dosaggio da 0,125 mg

- 4. Cosa rappresenta per l'infermiere il concetto di responsabilità professionale:**
 - A. un obbligo, intrinsecamente connesso all'esercizio della professione, di rispondere del proprio operato se eseguito in modo non corretto
 - B. un obbligo di dover dimostrare l'assenza di un nesso di causalità tra l'azione compiuta e il fatto
 - C. un obbligo di rispondere in prima persona di un fatto o di un atto compiuto nell'esercizio delle proprie funzioni con piena autonomia decisionale
 - D. un obbligo ad operare in modo corretto anche in circostanze non regolamentate dalla norma

- 5. Un infermiere sta preparando un farmaco per la successiva somministrazione per via intramuscolare contenuto in un flaconcino. Quale tra le seguenti condizioni è errata:**
 - A. controllare frettolosamente la prescrizione medica
 - B. detergere il tappo del flaconcino con un tampone antisettico
 - C. identificare il paziente
 - D. aspirare il farmaco e abbandonare la siringa preparata sul carrello per rispondere alla chiamata di un paziente

- 6. Per il professionista Infermiere il Codice deontologico rappresenta:**
 - A. uno strumento che indica i principi e regola i comportamenti che gli esercenti una professione sanitaria devono osservare, nell'interesse esclusivo delle persone assistite, ai fini del corretto esercizio della professione
 - B. uno strumento per la difesa dei professionisti sanitari alla luce della Legge 8 marzo 2017, n.24
 - C. uno strumento che indica i principi e regola le attività del professionista sanitario al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
 - D. uno strumento di orientamento contrattuale

- 7. Con il termine "empowerment" in ambito sanitario si definisce:**
 - A. la tendenza a "dare" più potere decisionale agli utenti coinvolgendoli nelle decisioni
 - B. la tendenza a "dare" più potere agli utenti coinvolgendoli nell'assistenza
 - C. la tendenza a "dare" minor potere decisionale agli utenti coinvolgendoli nelle decisioni
 - D. la tendenza a "dare" più potere discrezionale agli utenti coinvolgendoli nelle decisioni

- 8. Indicare il comportamento errato durante un trattamento emotrasfusionale:**
 - A. verificare che il gruppo sanguigno del ricevente sia compatibile con quello indicato sull'etichetta dell'emocomponente da trasfondere
 - B. per i primi 15 minuti infondere il sangue lentamente
 - C. in caso di reazione trasfusionale, avvertire il medico, sospendere la trasfusione rimuovendo anche l'ago cannula
 - D. verificare l'identità del paziente, la presenza della prescrizione e del consenso specifico

9. Quale tra le seguenti è la definizione corretta di "effetti collaterali" di un farmaco:

- A. effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
- B. effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
- C. effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
- D. effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici

10. Chi ha elaborato la teoria dei bisogni:

- A. H. Peplau
- B. V. Henderson
- C. M. Rogers
- D. D. Orem

11. Nella disinfezione dell'exit-site durante la medicazione dell'accesso venoso periferico quale tra i seguenti antisettici utilizzo:

- A. la clorexidina al 2% in soluzione alcolica
- B. l'ipoclorito di sodio
- C. lo iodopovidone
- D. l'alcool isopropilico al 70%

12. La CPAP (Continue Positive Airways Pressure):

- A. necessità di curarizzazione o sedazione profonda
- B. è una ventilazione spontanea a pressione negativa
- C. non è indicata nell'embolia polmonare in quanto ne peggiora l'outcome
- D. è una ventilazione spontanea a pressione positiva

13. Nella dieta di un paziente in emodialisi, acqua e sodio devono essere:

- A. aumentati
- B. aboliti
- C. ridotti in ogni caso
- D. ridotti in relazione alla diuresi residua, alla presenza di edemi e/o ipertensione

14. Il servizio sanitario nazionale deve garantire:

- A. le stesse risorse a tutte le regioni
- B. lo sviluppo della ricerca scientifica
- C. livelli essenziali ed uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale e nei confronti dell'intera collettività
- D. la tutela dell'ambiente in quanto fattore determinante di salute collettiva

15. All'emogasanalisi arteriosa il range di normalità della PaO2 in un soggetto sano corrisponde a:

- A. 35 - 45 mmHg
- B. 80 - 100 mmHg
- C. 24 - 30 mmHg
- D. 60 - 80 mmHg

16. L'Atassia è:

- A. la mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
- B. la differenza del diametro delle due pupille
- C. la perdita della capacità di parlare dopo uno stroke ischemico cerebrale
- D. l'incapacità di scrivere tipica nel soggetto con disturbi di apprendimenti di grado elevato

17. Le Scale di Norton o di Braden:

- A. sono uno strumento di valutazione del rischio di cadute nell'anziano
- B. sono uno strumento per il calcolo della dipendenza dell'assistito
- C. sono uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- D. sono uno strumento per la valutazione del rischio di depressione nell'anziano fragile

18. Il D.M. 739/94 all'art. 2 stabilisce che:

- A. l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa
- B. l'assistenza infermieristica curativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa
- C. l'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa ed educativa è di natura tecnica, relazionale, riabilitativa
- D. l'assistenza infermieristica curativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, sociale

19. Tra le seguenti affermazioni, quale contiene una completa descrizione di consenso informato:

- A. un dovere dell'operatore sanitario di informare prima di un intervento il paziente maggiorenne e capace d'intendere e di volere
- B. un diritto del paziente maggiorenne e capace d'intendere e di volere che deve essere tutelato dal medico
- C. una manifestazione libera e consapevole del paziente maggiorenne e capace d'intendere e di volere rispetto alle cure ed all'assistenza sanitaria
- D. un diritto del paziente maggiorenne capace d'intendere di volere che deve essere tutelato da ogni professionista sanitario

20. Il processo di nursing include:

- A. raccolta nella documentazione di tutti i componenti dell'equipe sanitaria che eroga l'assistenza al paziente
- B. prescrizioni mediche, dati demografici e gestione della terapia
- C. diagnosi infermieristiche, obiettivi, interventi infermieristici e valutazione
- D. valutazione del paziente, trattamento medico, interventi assistenziali, e valutazione

21. Qual è la definizione di "near miss" nell'ambito del rischio clinico:

- A. errore che non causa un evento avverso, che si verifica per caso fortuito o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
- B. errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente
- C. errore che causa un evento avverso, che si verifica per caso fortuito o perché ha conseguenze avverse per il paziente
- D. errore che causa un evento sentinella e che richiede una segnalazione immediata e dedicata

22. Tra i criteri generali per la terapia del dolore risulta importante somministrare i farmaci:

- A. prima che compaia il dolore
- B. prima delle ore notturne per favorire il riposo del paziente
- C. quando compare il dolore
- D. solo quando il dolore è insopportabile

23. Con il termine epidemia intendiamo:

- A. il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio
- B. la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia e in breve periodo di tempo
- C. la comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- D. la comparsa di un numero ridotto di casi di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio

24. In un paziente iperteso con epistassi, l'infermiere si preoccupa di garantire una posizione:

- A. con capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso
- B. con capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda
- C. con capo chino in avanti posizionando sotto il mento una arcilla per raccogliere e valutare l'entità della perdita ematica
- D. in posizione di Trendelenburg

25. Il paziente ha una dipendenza totale nelle ADL, i parametri vitali sono buoni, viene somministrata ossigenoterapia a bassi flussi con occhiali nasali, è in fase di dimissione. In base ai dati disponibili:

- A. l'igiene a letto deve essere effettuata da un infermiere supportato da un OSS
- B. l'igiene a letto deve essere effettuata preferibilmente da due infermieri vista la presenza di ossigenoterapia
- C. l'igiene a letto può essere attribuita agli operatori di supporto (OSS)
- D. nessuna delle precedenti è corretta

26. In un reparto di terapia intensiva sono aumentati significativamente i casi di infezione delle vie respiratorie nei pazienti ricoverati. Tale condizione potrebbe essere messa in relazione a:

- A. una scarsa attenzione all'igiene corporea dei pazienti
- B. alla non effettuazione sistematica di due broncoaspirazioni per turno
- C. ad una scarsa attenzione all'igiene del cavo orale nei pazienti
- D. nessuna delle risposte è corretta

27. Per la detersione di una colostomia si utilizza:

- A. soluzione fisiologica al 0,9%
- B. acqua e sapone neutro
- C. Iodio povidone
- D. Clorexidina 0,2%

28. L'infermiere deve somministrare soluzione fisiologica 0,9 % 2000 ml in 24 ore. A che velocità di infusione deve impostare il dispositivo di gocciolamento controllato:

- A. 53 ml/ora
- B. 33 ml/ora
- C. 83 ml/ora
- D. 63 ml/ora

29. L'infermiere deve preparare una soluzione glucosata 5% 250 ml + K -Flebo 6 mEq. In reparto sono disponibili le fiale di K -Flebo da 3 mEq/ml in fiale da 10 ml. Quanti ml di farmaco deve aspirare per preparare come da prescrizione l'infusione:

- A. 2,5 ml
- B. 1,5 ml
- C. 2 ml
- D. 4 ml

30. I seguenti sono tutti segni e sintomi dell'infezione di una ferita chirurgica, tranne:

- A. l'aumento della tumefazione in sede di ferita
- B. la comparsa di febbre
- C. la cute circostante la ferita pallida e fredda
- D. la comparsa di secrezioni aumentate e purulente

